

	福島県		県中地域				須賀川・岩瀬地区				石川地区				田村地区			
	第22週	第21週	第22週	第21週		第22週	第21週		第22週	第21週		第22週	第21週		第22週	第21週		
	感染症動向	感染症動向	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報	感染症動向	学校欠席者情報
インフルエンザ	83	114	0	2	10	6	0	2	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	36	28	2	0	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	156	149	17	0	15	0	10	0	5	0	0	0	0	0	7	0	10	0
感染性胃腸炎	252	258	57	24	49	19	51	14	47	12	0	2	0	6	6	8	2	1
水痘	50	32	29	42	4	9	28	30	3	0	0	11	0	8	1	1	1	1
手足口病	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	14	7	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
突発性発疹	35	35	6	0	8	0	5	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
百日咳	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	28	13	18	16	3	4	0	0	0	0	0	0	1	18	16	3	3	
RSウイルス感染症	34	16	3	4	2	1	3	0	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【感染症発生動向調査】 ※定点医療機関からの情報をもとに集計 【学校欠席者情報】 ※保育園、幼稚園、小中学校、高等学校の欠席者情報です。

県中地域の状況
〈水痘の流行が見られます〉
 県中地域、主に須賀川・岩瀬地区で水痘の流行が見られます。水痘は、空気感染・飛沫感染・接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度とされています。主な症状は発熱、発疹、倦怠感等です。
 水痘の予防には**予防接種**が最も重要となります。1回の接種により重症の水痘をほぼ100%予防でき、2回の接種により軽症の水痘も含めてその発症を予防できると考えられています。定期の予防接種は、標準的に**1回目が生後12月から生後15月までの間、2回目が1回目の接種から3月以上経過（標準的には6~12月までの間）**してから行うこととなっています。発症及び重症化を防ぐためにも、予防接種を受けることは重要です。

厚生労働省
ジカ熱・デング熱の運び屋
ヒトスジシマカの発生源を叩け!

■蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発生しそうな水たまりの除去・清掃をしましょう！
 ■下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう！

水たまり除去・清掃

- 植木鉢の皿
- 雨除けのブルーシートや古タイヤに溜まった水たまり
- 雨ざらしの用具
- 屋外に放置された空きビン・缶、ペットボトル

下草刈り

公園、学校、寺社、空海港、駅などの施設を管理されている方もご協力をお願いします！

風通しの悪いやぶ・草むら

■なぜ蚊が怖い？
 ジカ熱やデング熱は蚊を介して感染します。原因となるウイルスは、感染した人の血（日本ではヒトスジシマカ）の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルスを介し、感染を広げていきます。

■ジカ熱やデング熱に感染するとどうなる？
 感染しても全ての人に症状が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、発疹が出るといった症状が1週間ほど続きます。また、ジカ熱は妊婦が感染すると胎児や新生児に先天性障害をもたすリスクがみられ、デング熱では出血を伴うデング出血熱となり重症化することがあります。

【ヒトスジシマカ】
 ジカ熱、デング熱に関する詳しい情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

ジカ熱 予防策 検査 デング熱 予防策 検査

蚊媒介感染症に注意!

●蚊媒介感染症は、病原体を保有する蚊に刺されることで起こる感染症です。主な蚊媒介感染症には、デング熱、ジカウイルス感染症、日本脳炎などがあります。
 ●予防ポイントは「蚊を増やさない」「蚊に刺されない」ことです。

- 蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発生しそうな水たまりを除去・清掃しましょう。
 (植木鉢の皿、屋外に放置された古タイヤ、空き瓶、空き缶等)
- 下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう。
- 屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、できるだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、蚊にさされないよう注意しましょう。

詳しくは厚生労働省HP、福島県衛生研究所HPへ

- 厚生労働省
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>
- 福島県衛生研究所
<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21910a/topic-kansenshou.html>

ポスター引用：厚生労働省HP