

「県南地域感染症情報」に関する御意見、御質問等はFAXまたはメールでお願いします。
 メール返信の方は、右の「感染症情報連携シート」をクリックして記載願います。
 県南保健所生活衛生部医療薬事課
 FAX0248-23-1252 メールアドレス kansen_kennan@pref.fukushima.lg.jp

感染症情報連携シート

県内で風しんが発生しています。

<風しんの発生状況>

関東地方を中心に30～50歳代男性の風しん患者数が大幅に増加しており、平成31年の第1～12週の風しん患者数は、1,033人となり、昨年度の10倍以上、1,000人を越えました。
 県内では、福島市内の30歳代～50歳代の男性が相次いで風しんと診断され、12週には相双地区の30歳代の男性が風しんと診断されました。

<風しんについて>

風しんは、軽い風邪症状で始まり、発疹、発熱、後頭部リンパ節腫脹などが主症状です。脳炎や血小板減少性紫斑病を合併することもあります。特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、関節痛を認めるなど、小児より重症化することがあります。

また、妊婦が妊娠初期に風しんにかかると、お腹の中の赤ちゃんにも感染し、赤ちゃんが病気（先天性風しん症候群）を持って生まれる可能性があります。

<予防接種について>

麻しん・風しんワクチンを受けましょう

定期予防接種の時期・対象者

1期 1歳以上2歳未満

2期 小学校就学前の1年間（年度内に6歳になる者）

市町村によっては、

妊娠を希望する女性・その配偶者等

風しんの抗体検査受検費用や予防接種費用を助成している場合もあります。



★ 医療機関の皆様へ ★

- 1 風しんを診断した場合は直ちに保健所に届出と行政検査の協力をお願いします。
- 2 発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、予防接種歴を確認するなど風しんを意識した診療をお願いします。また、風しんの感染力の強さに鑑みた院内感染対策をお願いします。

福島県ホームページ

風しんに気をつけましょう

<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21045a/kansenkangokansen21.html>

妊娠を希望する女性、妊婦とご家族へ

風しんの報告数が増加しています
 風しんからお腹の子どもを守りましょう

- ・妊婦が風しんにかかることで、生まれながらにして眼や耳、心臓に障害をもった子どもが生まれることがあります。
- ・この障害は、先天性風しん症候群（CRS）とよばれています。

【皆様にご協力いただけること】

妊婦 妊娠を希望している人 妊婦の同居家族

抗体検査を受けましょう。

抗体価が低い場合 ↓ 抗体価が低い場合 ↓
 ワクチン接種を検討しましょう。

※ワクチン接種後2ヶ月程度は、避妊するようにしましょう。

- 不要不急の外出を避け、人混みに近づかないようにしましょう。
- 風しんを疑う症状（発熱、発疹など）が出現した際は、医師に相談しましょう。
※妊娠中は、ワクチン接種を受けることができません。

⚠️ 風しんの感染を拡大させる可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人を守るために
風しんに対する抵抗力を確認・獲得しましょう

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、
風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料[※]となります。

WHY?

Q:なぜ風しんへの抵抗力が必要なの?

A ・成人は小児に比べて症状が重くなる可能性があります。



WHAT?

Q:風しんに感染すると何が問題なの?


- A ・電車や職場など人が集まる場所で、多くの人に感染させる可能性があります。
- ・妊娠早期の妊婦に風しんを感染させると、赤ちゃんが先天性風しん症候群になる可能性があります。



HOW?

Q:では、どうしたら良いの?

- A ・まずは、風しんへの抵抗力を確認するため、抗体検査を受けましょう。
2019年4月以降、クーポン券が届きますのでクーポン券に従って抗体検査を受けて下さい。
2019年度は、1972(昭和47)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性に市区町村がクーポン券を送付します。
なお、2019年度にクーポン券が送付されない対象者も市区町村に希望すればクーポン券を発行し、抗体検査を受けられます。^{*}
注意:子どもの頃に風しんに感染したかどうか記憶が曖昧な場合も抗体検査を受けましょう。
- ・風しんへの抵抗力が無いこと(抗体なし)がわかった場合、風しんへの抵抗力(免疫)をつけるため、予防接種を受けましょう。



風しんとは
 感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき(飛沫)を吸い込んで感染します。
 小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になって入院することがあります。
 成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

先天性風しん症候群とは
 妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴とする先天性風しん症候群をもって生まれてくる可能性が高くなります。

※2019年4月以降、順次クーポン券が届く予定ですが、自治体により事業の開始時期や対応が異なるため、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。

