

麻しん(はしか)が急増しています！！

- ・麻しん(はしか)は、感染力が強く、感染者1人から12~18人にうつすといわれています。(新型コロナウイルス感染症の場合:感染者1人から2~3人)
- ・飛沫感染、接触感染の他に**空気感染**もします。
- ・症状としては、**発熱や咳、鼻水、目の充血**などの症状が現れ、2~3日熱が続いた後、**39℃以上の高熱と発疹**が出現します。
- ・現在、海外において麻しん(はしか)が流行しており、日本国内においても、海外からの帰国者等の感染者が相次いで報告されています。
- ・麻しん(はしか)は、空気感染もするため、手洗い・マスクだけでは予防できません。**ワクチン接種が最も有効な予防法**です。感染拡大防止のために、**ワクチンを接種しましょう！**



○ワクチン接種について

<麻しん(はしか)ワクチン接種状況>

生まれ	定期接種の回数	対策
~1972年9月30日	定められておらず、未接種の可能性あり。	感染歴がある方以外は2回接種 しましょう。
1972年10月1日~2000年4月1日	1回(免疫が不十分な可能性あり)	1回のみの方は 追加接種 をしましょう。
2000年4月2日	2回	2回未完了の方は 接種 をしましょう。

※ワクチンを**2回**接種しないと、十分な免疫が付きません！

※1度麻しん(はしか)に感染すると、**一生涯の免疫(終生免疫)**が獲得できるため、**再び麻しん(はしか)に感染することはほぼ無い**といわれています。

※妊婦中に感染すると、**流産や早産**の可能性があるので、**ワクチン接種は妊娠前**に行うことをおすすめします。



「四種混合ワクチン」に「ヒブワクチン」を加えた
「**五種混合ワクチン**」が、2024年4月から
定期接種の対象となります！

五種混合ワクチン

四種混合ワクチン

・百日咳 ・破傷風
・ジフテリア ・ポリオ



ヒブワクチン

<五種混合ワクチン 接種スケジュール>

1回目 : 生後**2ヶ月～7ヶ月**

2・3回目 : 1回目の接種から**4～8週空けて**接種

4回目 : 3回目の接種から**6ヶ月以上空けて**接種



ワクチンデビューは、五種混合とB型肝炎、ロタウイルス、
小児用肺炎球菌の**4つのワクチン**を同時接種することを
おすすめします！

参考:厚生労働省ホームページ(<https://www.mhlw.go.jp>)、福島県ホームページ(<https://www.pref.fukushima.lg.jp>)
NPO 法人 VPD を知って、子どもを守ろうの会(<https://www.know-vpd.jp>)

ワクチン接種については、ご自身の母子手帳を
確認し、かかりつけ医・医療機関にご相談ください。



発行日:令和6年3月25日

発行元:福島県県北保健所 医療薬事課 感染症予防チーム

住所 〒960-8012 福島市御山町8-30

電話 024-534-4113

ホームページ:検索キーワード

福島県県北保健所